婦人科レジメン

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
CBDCA単剤	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
PTX単剤	パクリタキセル	点滴	180 mg/m^2	day 1	21 日	
PTX+CBDCA （子宮頸がん）	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	
	パクリタキセル	点滴	175 mg/m^2	day 1		
PTX+CBDCA （卵巣・子宮体がん）	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	パクリタキセル	点滴	180 mg/m^2	day 1		
PTX+CBDCA （子宮頸がん）	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	
	パクリタキセル	点滴	175 mg/m^2	day 1		
dose dense TC	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	パクリタキセル	点滴	80 mg/m^2	day 1, 8, 15		
DTX単剤	ドセタキセル	点滴	70 mg/m^2	day 1	21 日	
DTX+CBDCA	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	
	ドセタキセル	点滴	75 mg/m^2	day 1		
ベバシズマブ+TC	カルボラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	パクリタキセル	点滴	175 mg/m^2	day 1		
	ベバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
LP （子宮体がん）	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	
	レンバチニブ	内服	20 mg	day 1–21		
ベバシズマブ	ベバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1	21 日	
ゲムシタビン	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8, 15	28 日	
AP	シスプラチン	点滴	50 mg/m^2	day 1	21 日	
	ドキソルビシン	点滴	60 mg/m^2	day 1		
ドキシル	ドキソルビシン （リポソーム化）	点滴	50 mg/m^2	day 1	28 日	
ACT-D(5日投与)	アクチノマイシンD	点滴	0.01 mg/kg	day 1–5	14 日	
MTX絨毛性疾患	メトトレキサート	筋注	0.4 mg/kg	day 1–5	14 日	
ハラヴェン	エリブリン	点滴	1.4 mg/m^2	day 1, 8	21 日	
THP	ピラルビシン	点滴	30 mg/m^2	day 1	28 日	

※AUC：area under the curve

その他の診療科のレジメン

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
エンドキサンパルス	シクロホスファミド	点滴	500 mg/m^2	day 1	28 日	各科共通
リツキシマブ	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	7 日	各科共通
GC療法	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8, 15	28 日	泌尿器科
	シスプラチン	点滴	70 mg/m^2	day 2		
GP療法	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8, 15	28 日	泌尿器科
	パクリタキセル	点滴	175 mg/m^2	day 1		
ドセタキセル療法	ドセタキセル	点滴	75 mg/m^2	day 1	21 日	泌尿器科
	プレドニゾロン	内服	10 mg	day 1–21		
カバジタキセル療法	カバジタキセル	点滴	25 mg/m^2	day 1	21 日	泌尿器科
	プレドニゾロン	内服	10 mg	day 1–21		
ペムブロリズマブ療法(3週)	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	泌尿器科 最大 12 ヶ月
ペムブロリズマブ療法(6週)	ペムブロリズマブ	点滴	400 mg	day 1	42 日	泌尿器科 最大 12 ヶ月
パドセブ+キイトルーダ	エンホルツマブ ベドチン	点滴	1.25 mg/kg	day 1, 8	21 日	泌尿器科 ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞは最大 2 年間
	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1		
ドキシル	ドキソルビシン （リポソーム化）	点滴	20 mg/m^2	day 1	28 日	皮膚科
CDDP+CPT-11	シスプラチン	点滴	60 mg/m^2	day 1	21 日	小細胞癌または神経内分泌癌
	イリノテカン	点滴	60 mg/m^2	day 1, 8, 15		
キイトルーダ3週	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	各科共通 MSI-High固形癌
キイトルーダ6週	ペムブロリズマブ	点滴	400 mg	day 1	42 日	各科共通 MSI-High固形癌
オプジーボ2週	ニボルマブ	点滴	240 mg	day 1	14 日	各科共通
オプジーボ4週	ニボルマブ	点滴	480 mg	day 1	28 日	各科共通

※MSI：microsatellite instability