血液内科レジメン（悪性リンパ腫）

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
CHOP	ドキソルビシン	点滴	50 mg/m^2	day 1	21 日	
	ビンクリスチン	点滴	1.4 mg/m^2（最大 2 mg）	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	750 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2（100 mg）	day 1-5		
CHOP（VDS）	ドキソルビシン	点滴	50 mg/m^2	day 1	21 日	
	ビンデシン	点滴	2 mg	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	750 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2（100 mg）	day 1-5		
THP-COP	ピラルビシン	点滴	30 mg/m^2	day 1	21 日	
	ビンクリスチン	点滴	1 mg/m^2 （最大 2 mg）	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	40 mg/m^2(60 mg)	day 1-5		
THP-COP（VDS）	ピラルビシン	点滴	30 mg/m^2	day 1	21 日	
	ビンデシン	点滴	2 mg	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	40 mg/m^2(60 mg)	day 1-5		
GCVP	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8	21 日	
	ビンクリスチン	点滴	1.4 mg/m^2（最大 2 mg）	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	750 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2（100 mg）	day 1-5		
R-CHOP	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	21 日	
	ドキソルビシン	点滴	50 mg/m^2	day 1		
	ビンクリスチン	点滴	1.4 mg/m^2（最大 2 mg）	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	750 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2（100 mg）	day 1-5		
R-CHOP（VDS）	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	21 日	
	ドキソルビシン	点滴	50 mg/m^2	day 1		
	ビンデシン	点滴	2 mg	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	750 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2（100 mg）	day 1-5		
R-THP-COP	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	21 日	
	ピラルビシン	点滴	30 mg/m^2	day 1		
	ビンクリスチン	点滴	1 mg/m^2（最大 2 mg）	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	40 mg/m^2(60 mg)	day 1-5		
R-THP-COP（VDS）	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	21 日	
	ピラルビシン	点滴	30 mg/m^2	day 1		
	ビンデシン	点滴	2 mg	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	40 mg/m^2(60 mg)	day 1-5		
VR-CAP	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	21 日	
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11		
	ドキソルビシン	点滴	50 mg/m^2	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	750 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2（100 mg）	day 1-5		
G-CHOP	オビヌツズマブ	点滴	1000 mg	day 1 （1 C目のみ day 1, 8, 15）	21 日	
	ドキソルビシン	点滴	50 mg/m^2	day 1		
	ビンクリスチン	点滴	1.4 mg/m^2（最大 2 mg）	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	750 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2（100 mg）	day 1-5		
Pola-R-CHP	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	21 日	
	ポラツズマブ ベドチン	点滴	1.8 mg/kg	day 1		
	ドキソルビシン	点滴	50 mg/m^2	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	750 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2（100 mg）	day 1-5		
GEM	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8, 15	28 日	
ベンダムスチン単剤	ベンダムスチン	点滴	120 mg/m^2	day 1, 2	21 日	
BR療法 （FL）	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	28 日	
	ベンダムスチン	点滴	90 mg/m^2	day 1, 2		
BR療法 （DLBCL）	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	21 日	
	ベンダムスチン	点滴	120 mg/m^2	day 1, 2		
PBR療法	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	21 日	
	ポラツズマブ ベドチン	点滴	1.8 mg/kg	day 1		
	ベンダムスチン	点滴	90 mg/m^2	day 1, 2		
G-トレアキシン	オビヌツズマブ	点滴	1000 mg	day 1 （1 C目のみ day 1, 8, 15）	28 日	
	ベンダムスチン	点滴	90 mg/m^2	day 1, 2		

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
リツキシマブ+レナリドミド療法	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1 (1 C目のみ day 1, 8, 15, 22)	28 日	
	レナリドミド	内服	20 mg	day 1-21		
ガザイバ単剤	オビヌツズマブ	点滴	1000 mg	day 1	2 ヶ月	維持療法は最長 2 年
リツキシマブ単剤	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	56 日	維持療法は最大 12 回
BDR療法	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 11	1-4 C目：21 日 5-8 C目：84 日	
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 4, 8, 11		
LSG15-1 (VCAP)	ビンクリスチン	点滴	1 mg/m^2(最大 2 mg)	day 1	7 日	
	シクロホスファミド	点滴	350 mg/m^2	day 1		
	ドキソルビシン	点滴	40 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	40 mg/m^2	day 1		
LSG15-2 (AMP)	ドキソルビシン	点滴	30 mg/m^2	day 1	7 日	上記レジメン終了後続けて施行
	ラニムスチン	点滴	60 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	40 mg/m^2	day 1		
LSG15-3 (VCEP)	ビンデシン	点滴	2.4 mg/m^2	day 1	14 日	上記レジメン終了後続けて施行
	エトポシド	点滴	100 mg/m^2	day 1-3		
	カルボプラチン	点滴	250 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	40 mg/m^2	day 1-3		
LSG15-1 (VCAP+ポテリジオ)	モガムリズマブ	点滴	1 mg/kg	day 1	7 日	1 C目は入院にて施行
	ビンクリスチン	点滴	1 mg/m^2(最大 2 mg)	day 2		
	シクロホスファミド	点滴	350 mg/m^2	day 2		
	ドキソルビシン	点滴	40 mg/m^2	day 2		
	プレドニゾロン	内服または点滴	40 mg/m^2	day 2		
LSG15-2 (AMP+ポテリジオ)	ドキソルビシン	点滴	30 mg/m^2	day 1	7 日	上記レジメン終了後続けて施行
	ラニムスチン	点滴	60 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	40 mg/m^2	day 1		
LSG15-3 (VCEP+ポテリジオ)	モガムリズマブ	点滴	1 mg/kg	day 1	14 日	上記レジメン終了後続けて施行
	ビンデシン	点滴	2.4 mg/m^2	day 1		
	エトポシド	点滴	100 mg/m^2	day 1-3		
	カルボプラチン	点滴	250 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	40 mg/m^2	day 1-3		
GDP	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8	21 日	
	シスプラチン	点滴	75 mg/m^2	day 1		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1-4		
R-GDP	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	21 日	
	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8		
	シスプラチン	点滴	75 mg/m^2	day 1		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1-4		
GCD	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1-4		
R-GCD	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	21 日	
	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8		
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1-4		
エプキンリ	エプコリタマブ	点滴	48 mg	2-3 C目： day 1, 8, 15, 22 4-9 C目：day 1, 15 10 C目以降：day 1	28 日	1 C目は入院にて施行
アドセトリス	ブレンツキシマブ ベドチン	点滴	1.8 mg/kg	day 1	21 日	
ジフォルタ	プララトレキサート	点滴	30 mg/m^2	day 1, 8, 15, 22, 29, 36	49 日	
イストダックス	ロミデプシン	点滴	14 mg/m^2	day 1, 8, 15	28 日	
A-CHP療法	ドキソルビシン	点滴	50 mg/m^2	day 1	21 日	
	ブレンツキシマブ ベドチン	点滴	1.8 mg/kg	day 1		
	シクロホスファミド	点滴	750 mg/m^2	day 1		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2(100 mg)	day 1-5		
ABVD	ドキソルビシン	点滴	25 mg/m^2	day 1, 15	28 日	
	ブレオマイシン	点滴	9 mg/m^2(最大 15 mg)	day 1, 15		
	ビンブラスチン	点滴	6 mg/m^2(最大 10 mg/m^2	day 1, 15		
	ダカルバジン	点滴	250 mg/m^2	day 1, 15		
A＋AVD	ドキソルビシン	点滴	25 mg/m^2	day 1, 15	28 日	
	ビンブラスチン	点滴	6 mg/m^2(最大 10 mg/m^2	day 1, 15		
	ダカルバジン	点滴	250 mg/m^2	day 1, 15		
	ブレンツキシマブ ベドチン	点滴	1.2 mg/kg	day 1, 15		
ルンスミオ	モスネツズマブ	点滴	2 C目：60 mg 3-17 C目：30 mg	day 1	21 日	1 C目は入院にて施行
ポテリジオ	モガムリズマブ	点滴	1 mg/kg	day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56 日	
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	400 mg/回で 42 日間隔の投与も可
ポライビー+ルンスミオ (1サイクル目)	ポラツズマブ ベドチン	点滴	1.8 mg/kg	day 1	21日	
	モスネツズマブ	点滴	day 1：5 mg day 8, 15：45 mg	day 1, 8, 15		
ポライビー+ルンスミオ (2-8サイクル目)	ポラツズマブ ベドチン	点滴	1.8 mg/kg	day 1	21日	上記レジメン終了後続けて施行 7-8サイクル目はﾓｽﾈﾂｽﾞﾏﾌﾞのみ
	モスネツズマブ	点滴	day 1：45 mg	day 1		

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
ルンスミオ皮下注 （1サイクル目）	モスネツズマブ	点滴	day 1：5 mg day 8, 15：45 mg	day 1, 8, 15	21 日	
ルンスミオ皮下注 （2サイクル目以降）	モスネツズマブ	点滴	day 1：45 mg	day 1	21 日	最大 17 Cまで
ミンジュビ+R2療法 （1サイクル目）	タファシタマブ	点滴	1.2 mg/kg	day 1, 8, 15, 22	28 日	
	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 2, 8, 15, 22		
	レナリドミド	内服	20 mg	day 1–21		
ミンジュビ+R2療法 （2–3サイクル目）	タファシタマブ	点滴	1.2 mg/kg	day 1, 8, 15, 22	28 日	
	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1		
	レナリドミド	内服	20 mg	day 1–21		
ミンジュビ+R2療法 （4–5サイクル目）	タファシタマブ	点滴	1.2 mg/kg	day 1, 15	28 日	
	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1		
	レナリドミド	内服	20 mg	day 1–21		
ミンジュビ+R2療法 （6–12サイクル目）	タファシタマブ	点滴	1.2 mg/kg	day 1, 15	28 日	
	レナリドミド	内服	20 mg	day 1–21		
ミンジュビ+レナリドミド療法 （1サイクル目）	タファシタマブ	点滴	1.2 mg/kg	day 1, 4, 8, 15, 22	28 日	
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1–21		
ミンジュビ+レナリドミド療法 （2–3サイクル目）	タファシタマブ	点滴	1.2 mg/kg	day 1, 8, 15, 22	28 日	
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1–21		
ミンジュビ+レナリドミド療法 （4サイクル目以降）	タファシタマブ	点滴	1.2 mg/kg	day 1, 15	28 日	
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1–21		

※1 C：1 コース 2 C：2 コース ･･･

血液内科レジメン（CLL）

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
トレアキシン	ベンダムスチン	点滴	100 mg/m^2	day 1, 2	28 日	
BR療法	リツキシマブ	点滴	500 mg/m^2	day 1	28 日	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ 先発品を使用
	ベンダムスチン	点滴	90 mg/m^2	day 1, 2		
Ven＋リツキサン （2コース目）	リツキシマブ	点滴	375 mg/m^2	day 1	28 日	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ 先発品を使用 ﾍﾞﾈﾄｸﾗｸｽ 1 C目は単独投与 中程度以上のCYP3A阻害剤併用時は減量
	ベネトクラクス	内服	400 mg	day 1–28		
Ven＋リツキサン （3–7コース目）	リツキシマブ	点滴	500 mg/m^2	day 1	28 日	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ 先発品を使用 ﾍﾞﾈﾄｸﾗｸｽ 中程度以上のCYP3A阻害剤併用時は減量
	ベネトクラクス	内服	400 mg	day 1–28		
カルケンス＋ガザイバ （2コース目）	オビヌツズマブ	点滴	day 1：100 mg day 2：900 mg	day 1, 2	28 日	ｱｶﾗﾌﾞﾙﾁﾆﾌﾞ 1 C目は単独投与
	オビヌツズマブ	点滴	1000 mg	day 8, 15		
	アカラブルチニブ	内服	100 mg/回 1 日 2 回	day 1–28		
カルケンス＋ガザイバ （3－7コース目）	オビヌツズマブ	点滴	1000 mg	day 1	28 日	ｱｶﾗﾌﾞﾙﾁﾆﾌﾞ 8 C目以降は単独投与
	アカラブルチニブ	内服	100 mg/回 1 日 2 回	day 1–28		

※1 C：1 コース 2 C：2 コース ･･･

※CYP3A：cytochrome P450 3A

血液内科レジメン（多発性骨髄腫）

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
BD（週2回）	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11	21 日	
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 4, 8, 11		
BD（週1回）	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 8, 15, 22	35 日	
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
VRD	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11	21 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1–14		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 4, 8, 11		
VRD lite	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 8, 15, 22	35 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1–21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
VPD	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11	21 日	
	ポマリドミド	内服	4 mg	day 1–14		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 4, 8, 11		
VPD lite	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 8, 15, 22	35 日	
	ポマリドミド	内服	4 mg	day 1–21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
KRD療法 （1コース目）	カルフィゾミブ	点滴	20 mg/m^2	day 1, 2	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	カルフィゾミブ	点滴	27 mg/m^2	day 8, 9, 15, 16		
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1–21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
KRD療法 （2–12コース目）	カルフィゾミブ	点滴	27 mg/m^2	day 1, 2, 8, 9, 15, 16	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1–21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
KRD療法 （13コース目以降）	カルフィゾミブ	点滴	27 mg/m^2	day 1, 2, 15, 16	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1–21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
ERD療法 （1–2コース目）	エロツズマブ	点滴	10 mg/kg	day 1, 8, 15, 22	28 日	
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1–21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
ERD療法 （3コース目以降）	エロツズマブ	点滴	10 mg/kg	day 1, 15	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1–21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
EPD療法 （1-2コース目）	エロツズマブ	点滴	10 mg/kg	day 1, 8, 15, 22	28 日	
	ボマリドミド	内服	4 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
EPD療法 （3コース目以降）	エロツズマブ	点滴	20 mg/kg	day 1	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	ボマリドミド	内服	4 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
KD(週2回)療法 1コース目	カルフィゾミブ	点滴	20 mg/m^2	day 1, 2	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 40 mg/日を 20 mg/日の 2 日間連日投与 に分割可
	カルフィゾミブ	点滴	56 mg/m^2	day 8, 9, 15, 16		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
KD(週2回)療法 2コース目以降	カルフィゾミブ	点滴	56 mg/m^2	day 1, 2, 8, 9, 15, 16	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 40 mg/日を 20 mg/日の 2 日間連日投与 に分割可
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
KD(週1回)療法 1コース目	カルフィゾミブ	点滴	20 mg/m^2	day 1	28 日	
	カルフィゾミブ	点滴	70 mg/m^2	day 8, 15		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
KD(週1回)療法 2コース目以降	カルフィゾミブ	点滴	70 mg/m^2	day 1, 8, 15	28 日	
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
DLd療法 （1-2コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 8, 15, 22	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
DLd療法 （3-6コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 15	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
DLd療法 （7コース目以降）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
DPd療法 （1-2コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 8, 15, 22	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	ボマリドミド	内服	4 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
DPd療法 （3-6コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 15	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	ボマリドミド	内服	4 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
DPd療法 （7コース目以降）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	ボマリドミド	内服	4 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
DVd療法 （1-3コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 8, 15	21 日	
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 4, 8, 11		
DVd療法 （4-8コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1	21 日	
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 4, 8, 11		
DVd療法 （9コース目以降）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1	28 日	
Dara-VMP療法 （1コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 8, 15, 22, 29, 36	42 日	
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32		
	メルファラン	内服	9 mg/m^2	day 1-4		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2	day 2-4		
	デキサメタゾン	内服または点滴	20 mg	day 1, 8, 15, 22, 29, 36		
Dara-VMP療法 （2-9コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 22	42 日	
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 8, 22, 29		
	メルファラン	内服	9 mg/m^2	day 1-4		
	プレドニゾロン	内服または点滴	60 mg/m^2	day 2-4		
	デキサメタゾン	内服または点滴	20 mg	day 1, 22		
Dara-VMP療法 （10コース目以降）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1	28 日	
	デキサメタゾン	内服または点滴	20 mg	day 1		

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
DVRd療法 【移植非適応の場合】 （1-2コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 8, 15	21 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用 （d 15 のみﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝを使用） 20 mg/日の 2 日間連日投与を 40 mg/日の 1 日投与に変更可
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11		
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-14		
	デキサメタゾン	内服 or 点滴	20 mg	day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15		
DVRd療法 【移植非適応の場合】 （3-8コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1	21 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用 20 mg/日の 2 日間連日投与を 40 mg/日の 1 日投与に変更可
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11		
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-14		
	デキサメタゾン	内服または点滴	20 mg	day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12		
DVRd療法 【移植非適応の場合】 （9コース目以降）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1	28 日	
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
DVRd療法 【移植適応の場合】 （1-2コース目：寛解導入療法）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 8, 15, 22	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用 （d 8, 15 のみﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝを使用） 2 C目のday 8 は 10 mg
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11		
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	day 1-4, 9-12: 40 mg day 8: 20 mg day 15, 22: 10 mg	day 1-4, 8-12, 15, 22		
DVRd療法 【移植適応の場合】 （3-4コース目：寛解導入療法） （5-6コース目：地固め療法）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 15	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用 （d 15 のみﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝを使用）
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11		
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	day 1-4, 9-12: 40 mg day 15: 10 mg	day 1-4, 9-12, 15		
DVRd療法 【移植適応の場合】 （7コース目以降：維持療法期）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1	28 日	
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-28		
	デキサメタゾン	内服または点滴	10 mg	day 1		
Isa単剤	イサツキシマブ	点滴	20 mg/kg	1 C目：day 1, 8, 15, 22 2 C目以降：day 1, 15	28 日	
IsaD	イサツキシマブ	点滴	20 mg/kg	1 C目：day 1, 8, 15, 22 2 C目以降：day 1, 15	28 日	
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
IsaPD	イサツキシマブ	皮下注	1400 mg	1 C目：day 1, 8, 15, 22 2 C目以降：day 1, 15	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	ポマリドミド	内服	4 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
IsaKD （1コース目）	カルフィゾミブ	点滴	20 mg/m^2	day 1, 2	28 日	
	カルフィゾミブ	点滴	56 mg/m^2	day 8, 9, 15, 16		
	イサツキシマブ	皮下注	1400 mg	day 1, 8, 15, 22		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
IsaKD （2コース目以降）	カルフィゾミブ	点滴	56 mg/m^2	day 1, 2, 8, 9, 15, 16	28 日	
	イサツキシマブ	皮下注	1400 mg	day 1, 15		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
IsaVRd 【IMROZ試験】 （1-4コース目）	イサツキシマブ	皮下注	1400 mg	1 C目： day 1, 8, 15, 22, 29 2-4 C目： day 1, 15, 29	42 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32		
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-14, 22-35		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 4, 8, 11, 15, 22, 25, 29, 32		
IsaVRd 【IMROZ試験】 （5コース目以降）	イサツキシマブ	皮下注	1400 mg	5-17 C目： day 1, 8, 15, 22 18 C目以降：day 1	28 日	
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	20 mg	day 1, 8, 15, 22		
IsaVRd 【BENEFIT試験】 （1-12コース目）	イサツキシマブ	皮下注	1400 mg	1 C目：day 1, 8, 15, 22 2-12 C目：day 1, 15	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ投与日は注射で投与
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 8, 15		
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	20 mg	day 1, 8, 15, 22		
IsaVRd 【BENEFIT試験】 （13コース目以降）	イサツキシマブ	皮下注	1400 mg	day 1	28 日	
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	13-18 C目：day 1, 15 19 C目以降：なし		
	レナリドミド	内服	25 mg	day 1-21		
DKd療法 （1コース目）	カルフィゾミブ	点滴	20 mg/m^2	day 1, 2	28 日	
	カルフィゾミブ	点滴	56 mg/m^2	day 8, 9, 15, 16		
	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 8, 15, 22		
	デキサメタゾン	内服または点滴	20 mg	day 1, 2		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 8, 15, 22		
DKd療法 （2コース目）	カルフィゾミブ	点滴	56 mg/m^2	day 1, 2, 8, 9, 15, 16	28 日	
	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 8, 15, 22		
	デキサメタゾン	内服または点滴	20 mg	day 1, 2, 8, 9, 15, 16		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 22		
DKd療法 （3-6コース目）	カルフィゾミブ	点滴	56 mg/m^2	day 1, 2, 8, 9, 15, 16	28 日	
	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 15		
	デキサメタゾン	内服または点滴	20 mg	day 1, 2, 8, 9, 15, 16		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 22		
DKd療法 （7コース目以降）	カルフィゾミブ	点滴	56 mg/m^2	day 1, 2, 8, 9, 15, 16	28 日	
	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1		
	デキサメタゾン	内服または点滴	20 mg	day 1, 2, 8, 9, 15, 16		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 22		

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
Dara-VCd （1-2コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 8, 15, 22	28 日	ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ 先発品を使用
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 8, 15, 22		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
	シクロホスファミド	内服	300 mg/m^2	day 1, 8, 15, 22		
Dara-VCd （3－6コース目）	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg	day 1, 15	28 日	ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ 先発品を使用
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3 mg/m^2	day 1, 8, 15, 22		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
	シクロホスファミド	内服	300 mg/m^2	day 1, 8, 15, 22		
エルラナタマブ （2コース目以降）	エルラナタマブ	皮下注	76 mg	day 1	7 日 25 C目以降: 14 日	1 C目は入院にて施行
テクリスタマブ	テクリスタマブ	皮下注	1.5 mg/kg	day 1	7 日	1 C目は入院にて施行 部分奏功以上が 24 週以上持続: 14 日に短縮可
ターピー （2コース目以降）	トアルクエタマブ	皮下注	0.8 mg/kg	day 1	14 日	1 C目は入院にて施行
BelaPd （1コース目）	ベランタマブ	点滴	2.5 mg/kg	day 1	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	ポマリドミド	内服	4 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		
BelaPd （2コース目以降）	ベランタマブ	点滴	1.9 mg/kg	day 1	28 日	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 内服時はレナﾃﾞｯｸｽを使用
	ポマリドミド	内服	4 mg	day 1-21		
	デキサメタゾン	内服または点滴	40 mg	day 1, 8, 15, 22		

※1 C：1 コース 2 C：2 コース ・・・

血液内科レジメン（MDS・AML）

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
ビダーザ(皮下注射)	アザシチジン	皮下注	75 mg/m^2	day 1-7	28 日	年齢等に応じて日数短縮
ビダーザ(静脈注射)	アザシチジン	点滴	75 mg/m^2	day 1-7	28 日	年齢等に応じて日数短縮
ビダーザ＋ベネクレクスタ （2コース目以降）	アザシチジン	皮下注または 点滴	75 mg/m^2	day 1-7	28 日	ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ・ﾍﾞﾈｸﾗｸｽ 年齢等に応じて日数短縮 ﾍﾞﾈｸﾗｸｽ 中程度以上のCYP3A阻害剤併用時は減量
	ベネトクラクス	内服	400 mg	day 1-28		
ビダーザ＋ティブソボ （2コース目以降）	アザシチジン	皮下注または 点滴	75 mg/m^2	day 1-7	28 日	ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ 年齢等に応じて日数短縮
	ベネトクラクス	内服	500 mg	day 1-28		